

Kratki proceduralni priručnik za osoblje IZVAN JIL-a

Sigurna primjena inotropa i vazopresora

KADA OBAVITI PROVJERU?

1. Na početku primjene inotropa ili vazopresora.
2. Prilikom primopredaje od druge medicinske sestre.
3. Obavljajte kontinuiranu procjenu tijekom davanja infuzije.

VAŽNE INFORMACIJE ZA MED. SESTRU

Inotropi i vazopresori služe za održavanje krvnog tlaka. To su, primjerice, noradrenalin, vasopressin.

1. Infuzija inotropa/vazopresora **NE SMIJE SE NIKADA:**

- dati u bolusu: to izaziva opasno povišenje krvnog tlaka i pulsa
- dopustiti da istekne: to izaziva brz pad krvnog tlaka
- prekinuti ili pauzirati (osim ako to ne učini tim iz JIL-a)

2. Pristup

- **OBAVEZNO** primijeniti putem centralnog venskog katetera prikladnog lumena
- Infuzija inotropa/vazopresora mora biti jasno obilježena

3. Pumpe

- **UVIJEK** uključite pogon pumpe / štrcaljke u bolnički izvor energije
- Pripremite pričuvnu štrcaljku za svaku infuziju inotropa/vazopresora da ne istekne
- Po mogućnosti pripremite rezervnu pumpu



4. Praćenje

- **UVIJEK** kontinuirano pratite EKG i krvni tlak



KLJUČNI SIGURNOSNI PROBLEMI / KADA POZVATI POMOĆ

1. Nestabilan krvni tlak: **Zvati pomoć ako je sistolički RR <80mmHg**
2. Nestabilan puls: **Pozvati pomoć ako je puls <55 ili >130**
3. **Pozvati pomoć u slučaju značajnih promjena EKG-a**
4. Preostao je 1 sat infuzije ili manje