

Kratki proceduralni priručnik za osoblje IZVAN JIL-a

Sigurna njega neinvazivno ventiliranog pacijenta

KADA OBAVLJATI?

1. Na početku primjene NIV-a
2. Kontinuirana procjena tijekom primjene NIV-a
3. Prilikom promjene položaja

KAKO OBAVLJATI?


1. STAVLJANJE MASKE

- Postavite masku preko nosa i usta
- Prvo postavite masku bez pričvršćivanja remenja da ublažite osjećaj tjeskobe
- Fiksirajte remenje tako da maska tijesno prianja



2. POLOŽAJ MASKE / PROPUŠTANJE

- Provjerite da nema propuštanja
- Propuštanje znači da NIV nije učinkovit
- Propuštanje na gornjem dijelu maske nadražuje oči



3. REAKCIJA PACIJENTA

- Provjerite saturaciju kisikom
- Procijenite rad disanja i frekvenciju
- Provjerite puls / ritam i krvni tlak
- Pratite Glasgow koma skalu (GCS)



KLJUČNI SIGURNOSNI PROBLEMI / KADA POZVATI POMOĆ

1. Pad saturacije kisikom: **pozovite pomoć ako je SpO2 <88**
2. Povećanje frekvencije disanja: **pozovite pomoć ako je frekvencija disanja >35 ili <8**
3. Pad razine svijesti: **pozovite pomoć ako je GCS <12**
4. Nestabilan krvni tlak; ritam srca / puls **pozovite pomoć ako je sistolički krvni tlak <80, puls <55 ili >130**
5. Kod povraćanja postoji rizik od aspiracije: **pozovite pomoć ako pacijent povraća s maskom na licu**
6. Klaustrofobija i tjeskoba