

# Kratki proceduralni priručnik za osoblje IZVAN JIL-a

## Njega centralnog venskog katetera

### KADA OBAVLJATI?

1. Svaki dan
2. Kod primjene lijekova
3. Prilikom zamjene obloge

### KAKO OBAVLJATI?

#### 1) Pregled mesta uvođenja

- Najmanje jednom na dan pregledavajte mjesto uvođenja i pratite znakove infekcije / ekstravazacije
- Dokumentirajte i izvještavajte sestru u JIL-u
- Provjeravajte da je kateter fiksiran



#### 2) Primjena lijekova

- Koristite bezigleni pribor na svim spojevima osim na kateteru za praćenje središnjeg venskog tlaka
- PRIJE i POSLIJE primjene lijekova, prebrišite spoj antiseptikom i pustite da se osuši na zraku.
- Provjerite propusnost katetera nekorištenih lumena aspiracijom krvi i povratnim propiranjem s 10 ml 0,9%-tne fiziološke otopine
- Provjerite kompatibilnost lijekova sa med. sestrom iz JIL-a
- Properite kateter s 10 ml 0,9%-tne obične fiziološke otopine PRIJE, IZMEĐU i POSLIJE primjene lijekova



#### 3) Zamjena prevoja

- Zamijenite ako se zaprlja, smoči ili više nije netaknut, odnosno svakih 7 dana
- Uklonite stari prevoj nesterilnim rukavicama; bacite je; skinite rukavice; dekontaminirajte ruke.
- Navucite sterilne rukavice; aseptično očistite mjesto uvođenja antiseptikom
- Primijenite sterilni, prozirni, polupropusni poliuretanski prevoj, npr. tegaderm
- Dokumentirajte zamjenu prevoja

### KLJUČNI SIGURNOSNI PROBLEMI / KADA POZVATI POMOĆ

1. Higijena ruku (PRIJE I POSLIJE), rukavice, pregača, **UVIJEK** uz tehnike asepse
2. Središnji kateteri se lako izmještaju pa treba pažljivo postupati prilikom okretanja / pomicanja
3. Pazite na taloženje lijeka – odmah obavijestite sestru iz JIL-a
4. Primijenite 70%-tni alkohol u slučaju poznate alergije/preosjetljivosti na klorheksidin
5. Konzultirajte se s med. sestrom iz JIL-a prije uklanjanja katetera – potreban je nadzor