


Kratki proceduralni priručnik za osoblje IZVAN JIL-a

Njega pacijenta s endotrahealnim tubusom (ETT)

Balon za navođenje (Pilot balloon) olakšava napuhivanje balončića (cuffa)



15-milimetarski adapter spaja vrećicu / ventil / masku ili spoj katetera na cijevi respiratora

Oznake dubine, također se nazivaju i oznakama duljine

KADA OBAVLJATI?

1. Sigurnosne provjere: na početku svake smjene, kao i PRIJE I POSLIJE promjene položaja
2. Kontinuirano: sprječavanje pomicanja ETT-a
3. Kontinuirano: praćenje saturacije O₂, prisutnosti sekreta, alarma na respiratoru


KAKO OBAVLJATI?

1. Sigurnosne provjere

- ETT JE FIKSIRAN, tj. spojnice ne smiju biti labave
- Zabilježite oznake dubine na usnama – ETT se ne bi smio pomicati dodatno UNUTRA ili VAN
- Zabilježite veličinu ETT-a
- Vrećica/ventil/maska i sukcija su dostupni/ispravni

Duljina reza ETT-a

Duljina ETT-a vezana / duljina



2. Sprječavanje pomicanja ETT-a

- Čvrsto pridržavajte ETT prilikom SVAKOG okretanja/premještanja
- Pacijenti mogu izvući ETT, stoga procijenite razinu sedacije / razmislite o mjerama sputavanja

3. Praćenje

- Smanjenje razine SpO₂ može ukazivati na sekreciju ili pomicanje ETT-a
- Ublažavanje sedacije povećava rizik da pacijent izvuče ETT
- Alarmi na respiratoru mogu ukazivati na sekreciju ili pomicanje ETT-a

KLJUČNI SIGURNOSNI PROBLEMI / KADA POZVATI POMOĆ

1. Promijenio se položaj ETT-a (oznake duljine su različite) **ILI** se čuje krkljanje dok pacijent diše **ILI** vokalizacija: **POZOVITE POMOĆ**
2. Pacijent poseže za ETT-om ili grize ETT kad je blaže sediran: **POZOVITE POMOĆ, spriječite pacijenta da poseže za cijevi i orientirajte pacijenta**
3. Neplanirano uklanjanje ETT-a: **POZOVITE POMOĆ I DAJTE KISIK** putem vrećice i maske
4. Praćenje: SpO₂ brzo pada, alarm na respiratoru: **POZOVITE POMOĆ**