

Kratki proceduralni priručnik za osoblje IZVAN JIL-a

Kako postupiti ako se oglasi alarm za SpO₂

KADA OBAVLJATI?

1. Kad se oglasi alarm za SpO₂

KAKO OBAVLJATI?


- a) Pogledajte monitor da biste vidjeli zašto se oglasio alarm
- b) Provjerite je li pacijent spojen na SpO₂
- c) Provjerite je li spojen izvor kisika
- d) Je li pacijent još uvijek spojen na respirator
- e) Ovlašava li se alarm i na respiratoru



- a) Je li endotrahealna cijev u ispravnom položaju
- b) Provjerite razinu kisika koju prima pacijent
- c) Treba li povećati razinu kisika
- d) Provjerite plinove u arterijskoj krvi



- a) Treba li pacijent bronhoaspiraciju
- b) Pomiču li se obje strane pacijentovog prsnog koša jednako
- c) Kašlje li pacijent



KLJUČNI SIGURNOSNI PROBLEMI / KADA POZVATI POMOĆ

1. Ako je SpO₂ <88: **pozovite pomoć**

2. Ako ne možete naći razlog za pad vrijednosti SpO₂:

↑Primijenite kisik dok čekate pomoć

3. **Uvijek se pobrinite da je dostupan još jedan način ventiliranja pacijenta**