

Amina Brulić

J.U. Opća bolnica "prim. dr. Abdulah Nakaš", Sarajevo (BiH)

amina07brulic@gmail.com

Parenteralna ishrana bolesnika u JIT-u (POSTER)

Parenteralna prehrana primjenjuje se u bolesnika kod koji nije moguće provesti peroralnu ili enteralnu prehranu zbog bolesti ili poremećaja funkcije gastrointestinalnog trakta. Njezina svrha je da u tolerantnom volumenu osigurava potrebnu količinu energetskih i nutritivnih supstanci - mikro i makro minerale i vitamine.

Metoda: Pri donošenju odluke o uvođenju parenteralne prehrane potrebno je procijeniti odnos koristi i rizika za svakog pojedinog bolesnika. U pothranjenih, hiperkataboličnih bolesnika izloženih stresu, nužno je parenteralnu prehranu otpočeti što ranije, unutar 48 do 72 sata. U dobro uhranjenih bolesnika za koje se očekuje da će se moći oralno ili enteralno hraniti unutar 5 do 7 dana, nije nužno provoditi parenteralnu nutritivnu potporu.

Posebne indikacije za paranteralnu prehranu su:

- Veliki kirurški zahvat u abdomenu
- Bolesti probavnih organa (pankreatitis, enterkutane fistule, Chronova bolest, ulcerozni kolitis, maligne boesti)
- Hipermetabolična stanja (teške višestuke ozljede, tetanus, opekline i septična stanja)

Uloga medicinske sestre u totalnoj parenteralnoj prehrani podrazumijeva dva čimbenika:

- Njegu endovenoznog katetera i pripremu infuzijskih otopina za parenteralnu prehranu
- Monitoriranje stanja bolesnika

KLJUČNE RIJEČI: parenteralna ishrana, intenzivna njega